

Verzeichnis der Steinfliegen Sachsens

nach: Joost, W. & R. Küttner (1997): Beitrag zur Kenntnis der Steinfliegen Sachsens (Plecoptera). - Entomologische Nachrichten und Berichte, 41 Heft 3: 213-232

(Datenstand: 1953 -1995)

		Lausitzer Hügel-, Berg- u. Flachland bis zur nördlichen Landesgrenze (100-300 m N.N.)	Elbsandsteingebirge (200-400 m N.N.)	Osterzgebirge (300-850 m N.N.)	Westerzgebirge (300-950 m N.N.)	Vogtland (200-400 m N.N.)	Sächsisches Hügel- und Flachland bis zur nördlichen Landesgrenze 90-400 m N.N.)
	Perlodidae						
1	<i>Diura bicaudata</i> (Linnaeus 1758)		x	+	+	x	
2	<i>Isogenus nubecula</i> Newman 1833		(+)	(+)			(+)
3	<i>Perlodes dispar</i> (Rambur 1842)	x	(+)				
4	<i>Perlodes microcephalus</i> (Pictet 1833)	+	+	+	+	+	+
5	<i>Isoperla difformis</i> (Klapálek 1909)	+	(+)			(+)	
6	<i>Isoperla goertzi</i> Illies 1952			x	+		
7	<i>Isoperla grammatica</i> (Poda 1761)	+	+	+	+	+	+
8	<i>Isoperla obscura</i> (Zetterstedt 1840)	x	(+)				
9	<i>Isoperla oxylepis</i> (Despax 1936)	+	+	+	+	+	x
10	<i>Isoperla pawlowskii</i> Wojtas 1961	x					
11	<i>Isoperla rivulorum</i> (Pictet 1841)	+		+	+		
12	<i>Isoperla silesica</i> Illies 1952				+		
13	<i>Isoperla sudetica</i> (Kolenati 1859)	x	x				
	Perlidae						
14	<i>Dinocras cephalotes</i> (Curtis 1827)		+	+	+	+	
15	<i>Marthamea vitripennis</i> (Burmeister 1839)		(+)				
16	<i>Perla abdominalis</i> Burmeister, 1839	+	+	+	+	+	
17	<i>Perla bipunctata</i> Pictet 1833		(+)		+		
18	<i>Perla marginata</i> (Panzer 1799)		+	+		+	
	Chloroperlidae						
19	<i>Chloroperla tripunctata</i> (Scopoli 1763)		x	+		x	
20	<i>Isoptena serricornis</i> (Pictet 1841)	x					
21	<i>Siphonoperla neglecta</i> (Rostock & Kolbe 1888)		x	+	+		
22	<i>Siphonoperla taurica</i> (Pictet 1841)	x					
23	<i>Siphonoperla torrentium</i> (Pictet 1841)	+	+	+	+	+	x
24	<i>Xanthoperla apicalis</i> (Newman 1836)	x	(+)				(+)
	Taeniopterygidae						
25	<i>Taeniopteryx araneoides</i> Klapálek 1902		(+)				
26	<i>Taeniopteryx auberti</i> Kis et Sowa 1964		+		?		
27	<i>Taeniopteryx nebulosa</i> (Linnaeus 1758)	+	(+)				(+)
28	<i>Brachyptera braueri</i> (Klapálek 1900)		(?)				(+)
29	<i>Brachyptera risi</i> (Morton 1896)			+	+		
30	<i>Brachyptera seticornis</i> (Klapálek 1902)	x	x	+	+	x	x
	Nemouridae						
31	<i>Amphinemura borealis</i> (Morton 1894)			x			
32	<i>Amphinemura standfussi</i> (Ris 1902)	+	+	+	+	+	x
33	<i>Amphinemura sulcicollis</i> (Stephens 1836)	+	+	+	+	x	x
34	<i>Amphinemura triangularis</i> (Ris 1902)		x		+		
35	<i>Nemoura avicularis</i> Morton 1894	+	+	+	x	+	+
36	<i>Nemoura cambrica</i> Stephens 1836	+	+	+	+	+	+
37	<i>Nemoura cinerea</i> (Retzius 1783)	+	+	+	+	+	+
38	<i>Nemoura dubitans</i> Morton 1894						x
39	<i>Nemoura flexuosa</i> Aubert 1949	+	+	+	+	+	+
40	<i>Nemoura marginata</i> Pictet 1835	+	+	+	+	+	+
41	<i>Nemoura mortoni</i> Ris 1902			+	+		

		Lausitzer Hügel-, Berg- u. Flachland bis zur nördlichen Landesgrenze (100-300 m N.N.)	Elbsandsteingebirge (200-400 m N.N.)	Osterzgebirge (300-850 m N.N.)	Westerzgebirge (300-950 m N.N.)	Vogtland (200-400 m N.N.)	Sächsisches Hügel- und Flachland bis zur nördlichen Landesgrenze 90-400 m N.N.)
42	<i>Nemoura sciurus</i> Aubert 1949	x			x		+
43	<i>Nemoura uncinata</i> Despax 1934			+	+		x
44	<i>Nemurella pictetii</i> Klapálek 1900	+	+	+	+	+	+
45	<i>Protonemura auberti</i> Illies 1954	+	+	+	+	+	+
46	<i>Protonemura hrabei</i> Rauser 1956		x	+	+		
47	<i>Protonemura intricata</i> (Ris 1902)	+	+	+	+	+	
48	<i>Protonemura lateralis</i> (Pictet 1835)				+		+
49	<i>Protonemura meyeri</i> (Pictet 1841)	+	+	+	+	+	x
50	<i>Protonemura montana</i> Kimmins 1941				x		
51	<i>Protonemura nimborum</i> (Ris 1902)			+	+		
52	<i>Protonemura nitida</i> (Pictet 1835)		x	+	+	x	
53	<i>Protonemura praecox</i> (Morton 1894)	+	+	+	+	+	
	Capniidae						
54	<i>Capnia bifrons</i> (Newman 1839)	+					+
55	<i>Capnia vidua</i> Klapálek 1904	+		+	+		
56	<i>Capnopsis schilleri</i> (Rostock 1892)						(+)
	Leuctridae						
57	<i>Leuctra albida</i> Kempny 1899	x		+	+	x	x
58	<i>Leuctra alpina</i> Kührtreiber 1934			+	+		
59	<i>Leuctra aurita</i> Navas 1919		x	+	+	x	
60	<i>Leuctra autumnalis</i> Aubert 1948			x	+		
61	<i>Leuctra braueri</i> Kempny 1898	+		+	+		x
62	<i>Leuctra digitata</i> Kempny 1899	+	x	+	+		+
63	<i>Leuctra fusca</i> (Linnaeus 1758)		+	x	+	x	+
64	<i>Leuctra handlirschi</i> Kempny 1898			+	+		
65	<i>Leuctra hippopus</i> Kempny 1899	+	+	+	+	+	x
66	<i>Leuctra inermis</i> Kempny 1899		x	+	+	+	
67	<i>Leuctra major</i> Brinck 1949				+		x
68	<i>Leuctra nigra</i> (Olivier 1811)	+	+	+	+	x	x
69	<i>Leuctra prima</i> Kempny 1899	+	+	+	+		x
70	<i>Leuctra pseudocingulata</i> Mendl 1968			+	+		
71	<i>Leuctra pseudosignifera</i> Aubert 1954	+		+	+		x
72	<i>Leuctra rauscheri</i> Aubert 1957			+	+		
73	<i>Leuctra rosinae</i> Kempny 1900				+		

Legende:

- x Nachweis neu für die Region seit BRAASCH (1968b)
- + Nachweis nach BRAASCH (1968b) (leicht verändert)
- () Historischer Nachweis nach Rostock (1868, 1870, 1874, 1879, 1881, 1892) und ROSTOCK & KOLBE (1888), KLAPÁLEK (1902, 1909), BRAASCH (1975), JOOST (1989)
- ? Fraglicher Nachweis